

## NOTA SOBRE EL METODO SEGUIDO PARA LA CORRECCION DE LAS ESTADISTICAS ESPAÑOLAS

P. Pallarés  
I.E.O., Madrid

Periodo 1978-79

Para este periodo histórico en el que la cobertura estadística era deficiente se utilizó el método que aparece descrito en la comunicación JTT/84/13 para la corrección de las estadísticas FISM del periodo anterior a 1980.

Periodo posterior a 1980

En un primer momento, se iniciaron las correcciones siguiendo el método adoptado en la Reunión preparatoria de Dakar y que aparece descrito en las comunicaciones JTT/81/1 y JTT/84/13. El análisis de los primeros resultados nos planteó dos tipos de problemas.

1) La comparación de los porcentajes específicos, por zona, bimestre y categoría de talla de las especies, obtenidos a partir de los muestreos ponderados y

de los libros de bordo presentaba, en algunos casos, diferencias no explicadas por los tipos de sesgo observados.

2) La aplicación de un mismo porcentaje a un amplia zona y a dos meses consecutivos, si bien consideradas globalmente corregían los sesgos detectados, a nivel puntual, y muy especialmente al aplicarse a los datos de C/E por cuadrícula de 10 x 10 (tarea II), producían profundos cambios en las composiciones específicas, lo que podría introducir sesgos <sup>nuevos</sup> sobre las capturas difícilmente evaluables.

Ante el análisis anterior, decidimos adoptar el mismo método seguido para la corrección de las estadísticas del periodo anterior a 1980 por considerar que, si bien las proporciones utilizadas de 1/4 de YF y 3/4 de SJ para obtener el deficit de BE resultaban más o menos arbitrarias, nos aseguraba cambios controlados en las capturas de YF y SJ.