

CAPTURES DE JEUNES ALBACORES (THUNNUS ALBACARES) AUX AÇORES

J. Pereira
Departamento de Oceanografia e Pescas
Universidade dos Açores, 9900-Horta, Açores, Portugal

SUMMARY

Important catches of small yellowfin have been made in the Azores in 1984. Information on the size composition of catches, fishing conditions and school composition are given in this document.

RESUME

Le présent document fournit des informations sur les importantes captures de jeunes albacores réalisés aux Açores en 1984. Les fréquences de taille des poissons capturés, la composition spécifique des bancs et les conditions de capture sont donnés.

RESUMEN

Se efectuaron importantes capturas de rabil pequeño en las Azores en 1984. En este documento se facilita información sobre composición por tallas de las capturas, condiciones de pesca y composición de los cardúmenes.

Les captures de jeunes albacores (*Thunnus albacares*) sont rares en dehors de l'Atlantique tropicale. Dans la zone des Açores, où les gros albacores sont capturés pendant l'été, la présence de jeunes exemplaires n'a jamais été signalée.

Au cours de la saison de pêche de 1984, des prises importantes de petits albacores, estimés en plus de 200 tonnes, ont été réalisées aux Açores, de juillet à octobre. Ces albacores juveniles ont été d'abord signalés dans la pêche à la senne et ensuite par les canneurs, qui ont réalisé la majorité des prises. En 1985, des captures sporadiques se sont aussi vérifiées par la flottille des canneurs.

Dans les cas de la senne, une seule calée avec des jeunes albacores a été observée et échantillonnée par un observateur embarqué. Elle a été faite sur un banc pur d'albacores. Les prises des canneurs, échantillonnées au débarquement, se sont réalisées sur différents types de bancs, des bancs purs d'albacore, des bancs mixtes avec des petits patudos ou listaos et aussi en bancs mixtes des trois espèces. Les bancs purs et l'association avec le listao ont été les plus fréquemment rencontrés.

Les captures se sont réalisées à des températures de surface comprises entre 20.5°C et 23°C, valeurs normales aux Açores dans cette saison. L'occurrence d'anomalies dans les conditions hydrologiques de l'Atlantique nord-est, pendant cette période, pourrait justifier la présence des jeunes albacores dans ces hautes latitudes.

Les tailles des poissons capturés se présentent dans un éventail de 50cm à 80cm et les modes principaux entre 58cm et 70cm. Les histogrammes de fréquences de taille des poissons échantillonnés en 1984 et 1985, sont donnés en fig. 1.




Fig. 1 - Fréquences de taille des jeunes albacores capturés en 1984 et 1985 aux Açores.